



STOP ZANZARE!



Comune di
Montebello
Vicentino

Campagna di prevenzione e lotta contro la zanzara tigre

LO SAPEVI CHE...?

- Le zanzare nascono in qualsiasi raccolta di acqua stagnante (sottovasi, bidoni, vasche, griglie, tombini, contenitori...).
- Le zanzare adulte riposano tra la vegetazione nelle zone umide e ombreggiate.
- La zanzara tigre non si riproduce nei fossi e nei canali, ma necessita di piccoli ristagni d'acqua (contenitori, griglie e tombini).

COSA FA IL COMUNE?

- Trattamenti antilarvali ogni 4 settimane nelle griglie caditoie, fossi ed altri focolai presenti in ambito pubblico.
- Trattamenti notturni adulticidi secondo la necessità.
- Interventi antilarvali e/o adulticidi mensili in tutti gli asili, scuole materne, elementari, e medie comunali.

L'importanza della collaborazione tra gli enti pubblici e la cittadinanza per prevenire e combattere la zanzara tigre



Segnalazioni:

Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica
via IV Novembre, 46 – Vicenza telefono 0444 752221 fax 0444 511127
email segreteria.sisp@aulss8.veneto.it

COSA PUOI FARE TU?

- Elimina tutti i ristagni di acqua che possono essere svuotati (secchi, bidoni, sottovasi...).
- Utilizza una compressa antilarvale ogni 2-4 settimane (da luglio a ottobre) per ogni ristagno di acqua che non può essere svuotato completamente (griglie, vasche, tombini).

BIDONI:

negli orti evitare che i bidoni rimangano scoperti; chiuderli ermeticamente e svuotarli ogni 2-3 giorni.

VASCHE:

se sono presenti pesci rossi o gambusie non ci sono problemi, altrimenti svuotare o trattare ogni 2-4 settimane con prodotti antilarvali.

SOTTOVASI:

svuotarli ogni 3-4 giorni oppure tenerli rovesciati.

SECCHI ED ALTRI CONTENITORI:

tenerli rovesciati e svuotarli completamente ogni 2-3 giorni.

PNEUMATICI:

non abbandonarli all'aperto; coprirli ermeticamente con teli di nylon.

CALENDARIO

per i trattamenti antilarvali nel proprio giardino
Metti un cerchietto ogni 4 settimane

LUGLIO

L	M	M	G	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AGOSTO

L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SETTEMBRE

L	M	M	G	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OTTOBRE

L	M	M	G	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

COME UTILIZZARE L'ANTILARVALE:

- Utilizzare una compressa ogni 2-4 settimane (a seconda delle temperature e della pulizia dell'acqua e in caso di piogge persistenti) per ogni ristagno di acqua.
- Gettare la compressa dentro l'acqua stagnante (griglie, tombini, vasche, bidoni...).
- A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate sono:
 - per le acque chiare: 1 compressa da 2 gr. ogni 1.000/2.000 litri
 - per acque a forte carica di materiale organico: 1 compressa da 2 gr. ogni 500/1.000 litri
 - per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini: 1 compressa da 2 gr. per 40 litri.
- Non creare ristagni artificiali per usare le compresse.
- Non va sciolta in acqua e data alla vegetazione.
- Non ingerire le compresse.
- Non utilizzare dentro cisterne con acqua potabile o autoclavi.